



Ett gödselmedel med hög svavelhalt och kväve. Innehåller ammoniumtiosulfat för snabb korrigering av svavelbrist i jordbruks- och trädgårdssgrödor.

#### INNEHÄLLER

Kväve (N): 151 g/l (som ammoniumkväve)  
Svavel (S): 345 g/l

#### APPLICERANINGSGRAD

##### Spannmål

Applicera 3-5 l/ha vid DC 30-31 och upprepa med 10-14 dagars mellanrum vid behov.  
Vete gynnas av en ny besprutning vid DC 55-79.

##### Raps

Applicera 5-10 l/ha vid stamförlängning och upprepa med 10-14 dagars mellanrum vid behov. Applicera inte under blomningen.

##### Potatis

Applicera 5 l/ha vid eller strax efter 100% emergens och upprepa med 10-14 dagars mellanrum vid behov.

##### Sokeribetor, bönor och ärtor

Applicera 5 l/ha vid 4-6-bladstadiet och upprepa med 10-14 dagars mellanrum vid behov.

##### Kälvväxter/torgtyp

Applicera 5 l/ha när grödan har 4-6 blad och upprepa med 10-14 dagars mellanrum vid behov.

##### Lök, purjolök, morötter

Applicera 5 l/ha när grödan är 15 cm hög och upprepa med 10-14 dagars mellanrum vid behov.

##### Majs

Applicera 5 l/ha från när grödan har 4-8 blad och upprepa 14 dagar senare.

##### Gräsklippage

Applicera 10 l/ha 4 veckor före den första (eller andra) skörden.

##### Vattenmängder

Använd i minst 200 liter vatten/ha i alla fall.

Applicera inte produkten i mycket starkt solljus eller vid temperaturer över 25°C.  
Om möjligt, bespruta på kvällen eller tidigt på morgonen för bästa resultat.

#### APPLICERING

##### Skaka behållaren väl före den öppnas och används.

Sprututrustningen ska vara ren. Fylla sprutranken till hälften med vatten, börja omskakning och tillsätt önskad mängd Thio-S. Skölj behållaren ordentligt, tillsätt sköljvätskan till sprutranken, fyll på och använd utan dröjsmål. Fortsätt hela tiden omskakningen. Rengör sprututrustningen noggrant efter användning.

Guard 2000® kan sättas till vid 0,1% v/v av vattenvolymen för att förbättra besprutningsretentionen och regnfastheten.

#### KOMPATIBILITET

Thio-S är fysiskt och kemiskt kompatibelt med ett brent sortiment av lantbrukskemiska produkter. Kontakta din leverantör för den senaste informationen. Uppdaterad information finns på [www.headland-ag.co.uk](http://www.headland-ag.co.uk). Läs alltid partnerprodukterns etikett noggrant innan blandning med Thio-S.

#### FÖRVARING

##### Skyddas mot frost. Förvaras vid temperaturer över 5°C.

Förvaras svagt och i väl ventilierad lämpig lokal. Förvara inte i direkt solljus eller intill direkta värmekällor. Förvaras oåtkomligt för barn. Förvaras åtskilt från livsmedel, dryck och djurfoder.

#### Säkerhetsföreskrifter

Denna produkt saknar klassificering enligt CLP.



**Headland Agrochemicals**  
Rectory Lane, Pentre, Flintshire, CH5 2DH United Kingdom  
Puh: +44(0)1244 537370 Fax: +44(0)1244 532097  
[flintshire.enquiry@fmc.com](mailto:flintshire.enquiry@fmc.com) [www.headlandcropnutrition.com](http://www.headlandcropnutrition.com)

15101782

# Thio-S



Runsaspitoinen rikkilannosite, joka sisältää myös typpeä. Sisältää ammoniumtiosulfatia.  
Tarkoitettu ravinto- ja koristekavien rikin puutoksen nopeaan korjaamiseen.

#### SISÄLTÖ

Typi (N): 151 g/l (ammoniakkina)  
Rikki (S): 345 g/l

#### MÄÄRÄ

##### Viljekasvit

Levitä 3-5 l/ha kasvuvaheessa 30-31 (korrenkasvan alkul) ja toista tarpeen mukaan 10-14 päivän välein.  
Vehnä hyöty ylimääräisestä lannoituksesta kasvuvaheessa 55-79 (tähkälletulo).

##### Rapsi

Levitä 5-10 l/ha korrenkasvuvaheessa ja toista tarvittaessa 10-14 päivän välein.  
Älä levitä kukinnan aikana.

##### Peruna

Levitä 5 l/ha mahdollisimman pian sen jälkeen, kun 100 % varsista on näkyvissä, ja toista tarpeen mukaan 10-14 päivän välein.

##### Sokerijurikas, pavut ja herneet

Levitä 5 l/ha, kun taimissa on 4-6 lehteä, ja toista tarvittaessa 10-14 päivän välein.

##### Kaali

Levitä 5 l/ha, kun taimissa on 4-6 lehteä, ja toista tarvittaessa 10-14 päivän välein.

##### Sipuli, purjokka

Levitä 5 l/ha, kun taimet ovat 15 cm korkeita, ja toista tarvittaessa 10-14 päivän kuluttua.

##### Maissi

Levitä 5 l/ha, kun taimissa on 4-8 lehteä, ja toista 14 päivän kuluttua.

##### Säiliörehuksi tarkoitettu heinä

Levitä 10 l/ha 4 viikkoa ennen ensimmäistä (tai toista) korjuuta.

##### Vesimääri

Käytä aina vähintään 200 litraa vettä hehtaaria kohti.

Älä levitä tuotetta kirkkaassa auringonvalossa tai yli 25 °C: lämpötilassa.  
Parhaat tulokset saavutetaan, jos ruiskuksen suoritetaan ilallia tai varhain aamulla.

#### LEVITYS

##### Ravistä pakkauksia huolellisesti ennen avaamista ja käyttöä.

Ruiskuksenlaiteistoon tulisi olla puhdas. Täytä ruiskuksessä puolilleen vedellä, aloita sekoittaminen ja lisää tarvittaava määriä.

Thio-S - tuoteita. Huuhtele pakkauksia huolellisesti, lisää huuhtelevesi säiliöön, suorita täytö Valmiksi ja levitä välittömästi. Jatka sekoittamista koko levityksen ajan. Puhdista ruiskuksenlaiteisto huolellisesti käytön jälkeen.

Lannoitteiden tasaista leväimistä, tarvitusta ja sateenkestoa voidaan parantaa lisäämällä liukseen 0,1 tilavuusprosenttia Guard 2000® -kinnettä.

#### YHTEENSOPIVUUS

Thio-S on fyysisesti ja kemiallisesti yhteensoviva monien muiden maatalouskemikaalien kanssa. Pyydä viimeimmät tiedot toimitajiltaasi. Ajantasaista tietoa on saatavilla myös osoitteesta [www.headland-ag.co.uk](http://www.headland-ag.co.uk). Lue aina muiden tuotteiden tuoteselosteet huolellisesti ennen niiden sekoittamista Thio-S - tuoteen kanssa.

#### VARASTOINTI

##### Suojaa pakkaseitaa. Säilytä vähintään 5 °C: lämpötilassa.

Säilytä vilielessä, tuotetussa tilassa, joka soveltuu kemikaalien varastointiin. Älä säilytä suorassa auringonvalossa tai lämmönlähteiden läheisyydessä. Pidä poissa lasten ulottuvilta. Pidä poissa elintarvikkeiden ja eläinten ravinnon läheisyydestä.

##### Turvallisuusohjeet:

Tätä tuotetta ei ole CLP-luokiteltu.



Cheminova A/S  
Thyborønvej 78  
DK-7673 Hårboøre

# Förpackning/Pakkauks: 10L

Partenummer: se förpackningens övre del Tillverkad i Storbritannien/ Erännumer: katso pakkauksen yläosaa Valmistettu Isossa-Britanniassa

- PARHAAN SADON PUOLESTA -

VILJELIJÄN BERNER.FI

07022017

5 703265 029117