

Avaunt®

rapsikuoriaisten torjuntaan
Huomaa ajoissa rapsikuoriaiset
öljykasveissa kelta-ansan avulla!

Kelta-ansan keltainen väri houkuttelee rapsikuoriaisten lisäksi myös muita tuhohyönteisiä öljykasvikasvustossa



- Kelta-ansa viedään öljykasvilohkolle heti kevätöljykasvien kasvun alkaessa. Syysöljykasvilohkolle kelta-ansa viedään keväällä lämpötilan ollessa noin +5°C.
- Pujota kelta-ansa keppiin, tarkista että voit nostaa ja laskea kelta-ansaa öljykasvikasvuston korkeuden mukaan. Kelta-ansan korkeus tulee aina olla sama kun kasvuston.
- Lisää kelta-ansaan noin 1 L vettä ja muutama pisara tiskiainetta. Aseta verkkolevy kelta-ansaan vähentääksesi riskiä ettei mehiläiset tai kimalaiset joudu veteen.
- Käy tarkastamassa kelta-ansaa joka aamu onko edellisen päivän aikana kelta-ansaan jäänyt rapsikuoriaisia. Kun rapsikuoriaisia löytyy kelta-ansasta, kannattaa heti tarkastaa kuoriaisten määrää kasvustossa ja laskea ylittykö torjuntakynnys.
- Tarvittaessa lisää vettä. Runsaiden sateiden jälkeen riski kasvaa että kelta-ansa täyttyy vedellä ja vuotaa yli, muista tarkastaa vesimäärä sateiden jälkeen.

TORJUNTAKYNNYKSET

Kasvin kehitysaste	Kevätöljykasvit rapsikuoriaisten lukumäärä keskimäärin	Syysöljykasvi rapsikuoriaisten lukumäärä keskimäärin
Aikainen nappuvaihe	0,5 – 1 kpl/kasvi	1–3 kpl/kasvi
Nappuvaiheen keskivaihe	1 – 2 kpl/kasvi	3 kpl/kasvi
Myöhäinen nappuvaihe	2 – 3 kpl/kasvi	5 – 10 kpl/kasvi

- Avaunt® on syömävaikutteinen ja on tärkeää että valmiste osuu niihin kasvinosiin joissa tuhohyönteisiä esiintyy. Pitkäaikaisvaikutus jopa 14 vrk saavutetaan vain niissä kasvinosissa joihin ruiskutusneste osuu suoraan. Tuhohyönteiset voivat säilyä elinkykyisinä 1-2 vrk ruiskutuksen jälkeen, mutta eivät enää pysty vioittamaan kasveja. Äärimmäisissä sääolosuhteissa ja kasvun ollessa erittäin voimakasta, tulisi ruiskuttaa kevätöljykasveja toisella tehoaineryhmään kuuluvalla valmisteella 4-5 päivää Avaunt® 150 EC käsittelyn jälkeen, mikäli toistuvasti uusia kuoriaisia ilmestyy.

Avaunt® käsittelyajankohta Kasvuaste 30 – 57
170 ml/ha



Avaunt®

för bekämpning av rapsbaggarna
Upptäck rapsbaggarna i tid
i oljeväxterna med gulskålens hjälp



Rapsbaggarna och andra skadeinsekter
i oljeväxterna attraheras av skålens gula färg



- Gulskålen placeras ut i fält så snart våroljeväxterna börjar växa. I höstrapsen placeras gulskålen på våren då temperaturen är ca +5°C.
- Placera gulskålen på käppen, kontrollera att gulskålen kan flyttas uppåt eller nedåt på käppen. Gulskålen bör alltid placeras på samma höjd som grödan.
- Fyll gulskålen med ca 1 L vatten och några droppar diskmedel. Lägga nätet ovanpå gulskålen för att minska risken att bin och humlor faller ned i vattnet.
- Besök gulskålen varje morgon för att räkna antalet rapsbaggarna som flugit in under föregående dag. Då rapsbaggarna finns i gulskålen lönar det sig att genast kontrollera grödan ifall bekämpningströskeln är uppnådd.
- Fyll på vatten vid behov. Vid kraftiga regnskurar finns det risk att gulskålen svämmar över, kom ihåg att kontrollera att vattennivån inte är för hög.

BEKÄMPNINGSTRÖSKLAR

Växtstadium	Våroljeväxter antal rapsbaggarna i medeltal	Höstoljeväxter antal rapsbaggarna i medeltal
Tidigt knoppstadium	0,5 – 1 st/växt	1–3 st/växt
Mitten av knoppstadiet	1 – 2 st/växt	3 st/växt
Sent knoppstadium	2 – 3 st/växt	5 – 10 st/växt

- Avaunt® verkar via förtäring, och det är viktigt att preparatet sprids jämnt i de växtdelar där skadegörarna förekommer. Långtidsverkan tom 14 dygn uppnås endast i de växtdelar som träffas direkt av sprutvätskan. Skadeinsekter kan förbli livsdugliga 1-2 dygn efter besprutningen, men de gör inte längre skada i växterna. Under extrema väderleksförhållanden och då tillväxten är kraftig, bör våroljeväxter besprutas med ett preparat från en annan grupp aktiva substanser 4-5 dagar efter Avaunt® behandlingen, speciellt om det kontinuerligt flyger in nya rapsbaggarna.

Avaunt® behandlingstid
170 ml/ha

Växtstadier 30 – 57



Avaunt® is a trademark of

